

[S-109]

Lokal İleri Bazal Hücreli Karsinom Tedavisinde Vismodegib Etkinliği ve Yan Etki Değerlendirilmesi: Tek Hekim Deneyimi

Utku Burak Bozbulut

özel hatay defne hastanesi

Amaç: Lokal İleri bazal hücreli karsinomada vismodegib tedavisi etkin bir hedefli ilaçtır. Tedavi yanıtları yüzde 40 ile 70 arasındadır. Yan etki olarak kas spazmları, asteni, tat alma duyusu kaybı, kilo kaybı ve saç kaybı sık görülmektedir. Bu çalışmada vismodegibin tedavi yanıtlarını ve yan etki profilinin ortaya konmasıdır.

Gereç-Yöntem: 2019-2022 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ve Özel Defne Hastanesi'nde Lokal İleri bazal hücreli karsinoma tanısı ile tedavi alan seksen üç hastanın dosyası tarandı. Tüm hastalar çalışmaya alındı. Hastaların demografik özellikleri, tanı anı patolojileri kaydedildi. Vismodegibe bağlı komplikasyonu olarak kas spazmları, asteni, tat alma duyusu kaybı, kilo kaybı, saç kaybı, dermatolojik komplikasyonlar ve eozinofili kaydedildi. (dosyalarda bunlarla ilişkili veriler bulundu.)

Bulgular: Seksen üç hastanın yüzde 62'si erkekti. Yaş ortalaması 62 idi. Hastaların tamamı lokal ileri inoperabl bazal hücreli karsinomu tanılıydı. Hastaların ortalama takip süresi on dokuz aydı. Objektif yanıt oranı yüzde yetmiş ikiydi. Medyan progresyonsuz sağ kalım süresi yirmi beş ay olarak saptandı. Yan etkilere bakıldığında kas spazmları (yüzde sekiz), asteni (yüzde beş), tat alma kaybı (yüzde üç), kilo kaybı (yüzde iki), ciddi cilt reaksiyonu iki hastada ve eozinofili sadece bir hastada görüldü.

Sonuç: Vismodegib lokal ileri bazal hücreli kanseri tedavisinde etkin bir tedavi yöntemi olmakla beraber yan etki profili yönetilebilir.

Anahtar Kelimeler: bazal hücreli karsinom, vismodegib