

[P-018]

Suriyeli göçmen ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında meme kanseri özellikleri

Oğur Karhan¹, Yasin Sezgin²

¹Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Şanlıurfa

²Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Siirt

Amaç:

Meme kanseri tanısı savaşın, göçün ve sosyoekonomik ve kültürel olarak geri kalmanın sonucu olarak geç kuyulmakta ve uygun tedaviye ulaşmada aksaklıklar oluşabilmektedir. Biz bu çalışmamızda Suriyedeki savaş sonrası Türkiyeye gelen Suriye uyruklu meme kanseri hastaları ile aynı dönemde meme kanseri tanısı konulan Türkiye Cumhuriyeti (TC) vatandaşlarının klinik, demografik ve patolojik özelliklerini incelemeyi amaçladık.

Gereç-Yöntem: Tıbbi onkoloji polikliniğine 2017 ile 2022 yılları arasında başvuran toplam 985 hasta tarandı, çalışmaya 294 hasta dahil edildi. Çalışmada Moleküler alt tipler luminal A, luminal B, HER 2 pozitif ve triple negatif olarak sınıflandırıldı. Proliferasyon indeksi olarak Ki-67 kullanıldı. Tümör boyutu AJCC 8. edisyona göre sınıflandırıldı. Çalışmamızda istatistiksel analizi SPSS 17.0 ile yapıldı. **Bulgular:** Ortalama tanı yaşı 49, Suriye uyruklularda 45, TC vatandaşı olanlarda 49 idi. Tanı sırasında metastatik olan hasta sayısı 66 (%22.4) olarak saptandı. Tanı sırasında metastatik olanlar Suriyeli 14/55(%25,5), TC vatandaşlarında ise bu oran 52/239 (%21.8) olup istatistiksel olarak farklı değildi. Moleküler alt tiplere bakıldığı zaman Luminal A TC vatandaşlarında %22.7, Suriye uyruklularda %11,1 iki grup arasında sınırda istatistiksel anlamlılık vardı (p: 0.058), Luminal B'nin her iki grupta %30 civarında olduğu, HER 2 pozitif TC vatandaşlarında %33,2 iken Suriye uyruklularda %46 (p:0,07), Triple negatifin ise her iki grupta benzer olduğu görüldü. (şekil-1) HER-2 pozitif ve triple negatif hasta gruplarında neoadjuvan kemoterapi alması gerekirken almayan hasta oranı TC vatandaşlarında %62.5 iken Suriye uyruklularda %73.7 olarak saptandı (p>0,05) (şekil-2)

Sonuç: Tanı sırasında metastatik hastalık oranının benzer olması Suriyelilerin sağlık sistemine ulaşıldıklarını göstermiş olabilir. Moleküler alt tiplerde luminal A grubu TC vatandaşlarında Suriyeli gruba göre yaklaşık 2 kat fazla olmasına rağmen istatistiksel olarak sınırda anlamlılık mevcuttu, hasta sayısı arttırılırsa fark istatistiksel anlamlılığa anlamlı erişebilir. Sadece triple negatif ve Her 2 pozitif hastalık alındığında dahi her iki gruptaki hastaların yarisından fazlası neoadjuvan tedavi almamış olup bu veri multidisipliner yaklaşımın ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir

Anahtar Kelimeler: meme kanseri, Suriyeli göçmen, TC vatandaşı

moleküler alt tip

Moleküler Alt Tip Dağılımı					
			TC vatandaşları		Total
			evet	hayır	
moleküler alt tip	Luminal A	Sayı	52	6	58
			22,7%	11,1%	20,5%
	Luminal B	Sayı	69	17	86
			30,1%	31,5%	30,4%
	HER2 +	Sayı	76	25	101
			33,2%	46,3%	35,7%
	Triple negatif	Sayı	32	6	38
			14,0%	11,1%	13,4%
Total		Sayı	229	54	283
			100,0%	100,0%	100,0%

Suriyeli göçmen ve TC vatandaşlarında moleküler alt tip

neoadjuvan alma oranı

Neoadjuvan kemoterapi				
		TC_vatandaşı		Total
		evet	hayır	
neoadjuvan kemoterapi	alması gerekirken almayan	50 62,5%	14 73,7%	64 64,6%
	diğer	30 37,5%	5 26,3%	35 35,4%
Total		80 100,0%	19 100,0%	99 100,0%