

[P-060]

Senkron Mide ve Rektum Kaynaklı Çift Primer Anjiyosarkom: Nadir Rastlanan Bir Olgu

Tanju Kapaçan, Nilüfer Bulut

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bölümü

Amaç: Anjiyosarkom, yumuşak dokulardaki kan ve lenfatik damaların endotelial hücrelerinden köken alan oldukça nadir görülen agresif seyirli bir malignitedir. Genelde altıncı ve yedinci dekada ortaya çıkan bu hastalık erkeklerde daha sık görülür. Anjiyosarkom klinik olarak daha çok deri, yumuşak doku, meme, karaciğer, dalak ve akciğerde görülür. Bu olgu, aynı anda hem midede hem de rektumda meydana gelen anjiyosarkom tanılı nadir bir vaka olması nedeniyle literatüre katkı sağlayacağı düşünülerek sunulmuştur.

Olgu: Kronik hastalık öyküsü olmayan, 10 paket/yıl sigara içme öyküsü olan 59 yaşında erkek hasta. Dört aydır giderek artan karın ağrısı ve şişkinlik yakınması nedeniyle polikliniğine başvurdu. Laboratuvar tetkiklerinde anemi, hipoalbuminemi dışında herhangi bir özellik saptanmadı. Hastanın batin MR incelemesinde karaciğer ve dalakta en büyüğü 7 cm çapında olan multipl nodüler lezyonlar, batin içi derinliği 10 cm'ye varan yaygın serbest sıvı, mide korpusunda simetrik duvar kalınlık artışı, rektumda ise polipoid lezyon saptandı. Gatroskopi incelemesinde mide korpus distalinde 1.5 cm boyutlu etrafı kabarık hiperemik halo ile çevrili ülser lezyon, kolonoskopi incelemesinde ise rektumda diminitif polip izlendi. Bu iki odaktan doku örnekleri alındı. Örnekler histopatolojik olarak anjiyosarkom ile uyumlu bulundu. İmmünohistokimyasal boyama ile CD31 ve ERG pozitif saptandı. Hastaya senkron çift primer anjiyosarkom tanısı konuldu. Sitolojik inceleme amaçlı alınan periton sıvı örneklemesinin sonucu hemorajik effüzyon olarak rapor edildi. Hastalığın doğası gereği taşıdığı yüksek kanama riski nedeniyle ek olarak karaciğer ve dalaktan biyopsi örnekleri alınmadı. Anrezeke olarak kabul edilen hastaya 21 günde bir alacak şekilde 75 mg/m² dozundan doksorubisin başlandı. Yaklaşık 2 aydır doksorubisin tedavisi altında takip edilen olgunun karın ağrısı tamamen geriledi, karın şişkinliği ise belirgin bir şekilde azaldı.

Sonuç: Gastrointestinal sistem kaynaklı anjiyosarkom tanısı olan hastalarda senkron kanser olma ihtimali her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Hastalığın klinik özelliklerini daha iyi anlamak, risk faktörlerini daha iyi karakterize etmek, hastalığı daha iyi yönetebilmek için daha fazla vaka ile daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Çift primer, anjiyosarkom, gastrointestinal sistem