

[P-085]

Malign Melanom Hastalarında Adjuvan Dabrafenib Trametinib Kombinasyon Tedavisinin Etkinlik ve Yan etki Değerlendirmesi:Tek Merkez Deneyimi

Erdoğan Seyran, İrem Bilgetekin, Cengiz Karaçin, Ömür Berna Öksüzoğlu
S.B.Ü Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara

Amaç: Evre 3 malignmelanomlu hastalarda BRAF mutasyonu varlığında 1 yıl süreyle adjuvan dabrafenib–trametinib tedavisinin nüksüz sağkalım üzerine etkinliği bilinmektedir. Çalışmamızda, adjuvan dabrafenib trametinib tedavisi verdiğimiz hastalarımızda tedavinin etkinlik ve toksisitesini incelemeyi amaçladık

Gereç-Yöntem: Mart2019- Kasım 2021 tarihleri arasında Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji kliniğinde takip edilen 9 evre 3 braf mutant malign melanom tanılı hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hasta verilerine dosya kayıtları ve sistem notlarından ulaşıldı. Çalışmamızda malign melanom adjuvan tedavi alan hastalar incelenmiş olup; hastaların yaş, cinsiyet, hastalık evresi, adjuvan tedavi süresi, nüks durum, tedaviye bağlı yan etki profili değerlendirildi ve veri tabanına kaydedildi

Bulgular: Çalışmaya adjuvandabrafenibtrametinib kombinasyonu alan 9 evre 3 hasta (3 kadın, 6 erkek) dahil edildi. Hastaların ortalanca yaşı: 49 (34-71 yaş) idi. Hastalık evresine bakıldığında evre 3B olan 5 ve Evre 3C olan 4 hasta saptandı. Adjuvan tedaviyi tamamlayan hasta sayısı 6 idi. 2 hasta yan etki nedeniyle adjuvan tedavilerini tamamlayamadı. 1 hasta adjuvan tedavisinin 4.ayında kendi isteğiyle tedaviyi bıraktı.Tüm hasta grubunun ortalanca ilaç kullanım süresi 10,5 (4-12 ay) ay ve ortalanca takip süresi 26(12-37 ay) aydı.Takip sürecinde daha önce tedaviyi kendi isteğiyle 4.ayda bırakan hastada 12.ayda nüks ve yaygın metastazlar saptandı.

Yan etkileri değerlendirdiğimizde; tedavinin sonlandırılmasına veya doz redüksiyonuna neden olan yan etki 2 hastada görüldü. Bir hastada grade 4 ateş ve grade 2 halsizlik nedeniyle tedavi 8.ayda ve diğer hastada grade 3 döküntü ve grade 2 ödem nedeniyle tedavi 11.ayda sonlandırıldı. 1 hastada grade 3 hepatoksisite gelişti ve kendi isteğiyle 4.ayda tedaviyi bıraktı. Diğer 6 hastadan; 2 tanesinde bir yan etki görülmezken, 4 hastada yan etkiler kontrol edilebilirdi ve tedavi 12aya tamamlandı

Sonuç: Adjuvandabrafenibtrametinib kombinasyonu verilen hastalarımızın takibinde; tedaviyi kendi isteğiyle bırakan 1 hasta dışında nüks olmaması ve tedavi tolerasyonunun iyi olması BRAF mutant olan hastaların adjuvan tedavi seçiminde bu kombinasyonun etkin ve güvenli olabileceğini göstermektedir

Anahtar Kelimeler: Adjuvan tedavi, Malign melanom, Yan etki