

Onkoloji Hastalarında Covid 19 Aşı Farkındalığı Anket Çalışması

Burcu Arslan Benli, Serdar Ata, Hale Kızıl Sürücüler, Timuçin Çil, Berna Bozkurt Duman
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Adana

GİRİŞ

COVID-19 pandemisi, ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmiş olup, tedavi ve aşılama için pek çok çalışma yapılmıştır. COVID-19'a yönelik inaktif aşılar, canlı atenüe aşılar, viral vektör aşıları ve mRNA aşıları mevcuttur. Ülkemizde hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri değerlendirilip, riskli gruplar Ocak 2021 tarihinden itibaren aşılanmaya başlamıştır.

MATERYAL – METOD

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniğine başvuran, onkolojik tanısı patolojik olarak doğrulanmış, aktif kemoterapi/immunoterapi alan veya tedavisi tamamlanıp izlemde olan 18 yaş üstü hastalar gönüllülük esasıyla 1 Ocak 2022- 1 Mart 2022 tarihleri arasında çalışmaya dahil edilmiştir.

BULGULAR

Çalışmaya katılan 278 hastanın 131'i erkek (%47), 147'si kadın (%53) cinsiyetindeydi. Hastaların yaşı ortanca 60 (18-85) yılı. Hastaların 33'ü (%12) henüz aşı olmamışken, 245 (%88) hasta en az bir doz aşı yaptırmıştı. Son aşı tarihi bilinen 176 hastadan, son 3 ayda aşılanmış hasta sayısı 75 (%42), son doz üzerinden 3 ay geçmesine rağmen rapel dozu uygulanmamış hasta sayısı ise 101 (%58)'di. Çalışmaya katılan hastaların 72'sinde Covid-19 geçirme öyküsü mevcuttu. Covid-19 enfeksiyonu geçiren hastaların %18'i aşısızken, % 47 hasta son 3 ayda rapel dozunu yaptırmamıştı. Hastaların %70'i mutlaka aşı yapılması gerektiğini düşünürken, %14'ü kararsız olup, %12 hastanın aşı ile bilgisi yoktu. %4 hasta aşı karşıtı olarak görüş belirtti. Hastaların aşı hakkında bilgi kaynağı en çok televizyon ve sosyal medya olarak belirlenirken aşısız hastaların aşı olmama nedeni aşı korkusu olarak saptandı. Aşılanma sayısı ile eğitim düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmazken remisyonda takip edilen hastaların daha çok aşılandığı saptandı (p: 0,04).

SONUÇ

Günümüzde Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle ölümler aşılama sonrası azalmıştır. Onkoloji hastaları riskli grup olarak kabul edilip, aşılamada ilk sırada yer alsa da, kılavuzlara uygun aşılanan hasta sayısı yetersizdir. Onkolojik hastalar,hastalık bahanesi ve aşı-kemoterapi ilişkisinin yarattığı korku nedeniyle topluma oranla daha az aşılanmaktadır. Onkolojik hasta grubunda farkındalığın artırılarak aşı motivasyonunun artırılacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: covid 19, aşı, kanser