

[S-028]

Erkek meme kanseri olgularının retrospektif analizi

Oktaý Ünsal, Ozan Yazıcı, Gözde Tahtacı, Nuriye Özdemir, Aytağ Üner, Nazan Günel, Ahmet Özet
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Erkek meme kanseri (EMK) nadir görülen bir kanser türüdür. Tüm meme kanserlerinin yaklaşık % 1 kadarını oluşturmaktadır. Sol meme tutulumu daha sık görülmekle birlikte vakaların %1'inde bilateral tutulum mevcuttur. Erkek meme kanseri olgularında kullanılan tanısal değerlendirme ve evreleme sistemi, kadın olgularla benzerdir. Çalışmamızda EMK'li olguların klinikopatolojik özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Çalışmamıza kliniğimizde takipli ve verilerine ulaşılabilen 29 erkek meme kanserli hasta dahil edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri, tümör özellikleri, aldıkları tedaviler ve genel sağkalımları incelenmiştir.

Bulgular: Hastaların median tanı yaşı 61 (36-85) idi. Histolojik olarak en sık tespit edilen alt tip invaziv duktal karsinom (%79,3) olup, hastaların %10,3'ünde ise miks histolojide tümör mevcuttu. Hormon profillerine göre %69'u Luminal A veya B, %27,6'sı HER2 pozitif ve %3,4'ü ise triple negatif gruptaydı. %62,1'inde tümör sol memede, %34,5'inde sağ memede ve %3,4'ünde ise bilateral yerleşimliydi. Tümör evrelemelerine göre değerlendirildiğinde; %41,4 hasta tanı anında evre 3, %31 hasta evre 1, %24,2'si evre 2 ve %3,4'ü ise tanı anında evre 3'tü. Hastaların %13,8'inin ailesinde meme kanseri öyküsü mevcuttu. Sadece 1 (%3,4) hastanın tanı anında metastatik olduğu tespit edildi. Tanı anında hastaların medyan beden kitle indeksi 28,5 kg/m² (21,13-36,5) idi. %17,2 hastaya neoadjuvan tedavi verilmişti. Metastatik hasta dışında ki tüm hastalar opere edilmişti. Hastalardan %86,2'si adjuvan kemoterapi, %62,1'i adjuvan radyoterapi ve %75,9'u adjuvan tamoksifen kullanmıştı. Median takip süresi 65 aydı (7-187). Hastalardan %13,8'inde takipte ikincil bir kanser gelişmişti. %27,6 hastada takipte nüks saptanmıştı. %34,5 hasta ise takiplerde ex olmuştur. Çalışmamızda median genel sağkalım(OS) 151 ay (111,6-190,3) ve median PFS ise 129 aydı (33,43-224,56).
Sonuç: Nadir görülen EMK'li hastaların tanı, evreleme ve tedavisi kadın meme kanserli hastalarla benzerdir. Çalışmamızdaki bulgular literatürle uyumludur.

Anahtar Kelimeler: Erkek meme kanseri, genel sağkalım, klinik özellikleri