

[P-194]

Tanı konulduktan 2 yıl sonra opere olan luminal A meme kanseri olgusu

Kerem Birol¹, Mustafa Seyyar², Elif Şahin², Pervin Can Şancı², Mutianur Özkorkmaz Akdağ², Yağmur Çakmak², Umut Kefeli², Devrim Çabuk², Kazım Uygun²

¹Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

²Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Amaç: Meme kanseri; kadınlarda en sık görülen, aynı zamanda akciğer kanserinden sonra ikinci en sık ölüme neden olan kanser türüdür. Meme kanserleri içinde en yüksek prevalansa sahip luminal A grubu; östrojen reseptörü (ER) pozitif, progesteron reseptörü (PR) pozitif, Cerb-B2 negatif, proliferatif aktivitesi, mitoz oranı ve histolojik derecesi düşük tümörleri kapsar. Luminal A meme kanseri hastaların prognozu çok iyi olup, metastazlar genellikle kemiklerle sınırlıdır. Burada erken evre luminal A meme kanseri tanısı konulduktan yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen metastatik olmaması üzerine opere olan hastayı sunmayı amaçladık.

Olgu: 75 yaşında kadın hasta memede ele gelen kitle nedeniyle Aralık 2019'da genel cerrahi polikliniğine başvurdu. Yapılan mamografide sağ meme üst dış kadranda 13x10 mm çaplı kitle lezyon saptandı. Hastaya tru-cut biyopsi planlandı. Biyopsi invaziv karsinom olarak sonuçlandı. İmmünohistokimyasal çalışmada; ER %100, PR%60, Cerb-B2 negatif, Ki67 %13 ve grade 2 olarak saptandı. Hastaya çekilen PET/BT'de sağ memede primer kitle dışında lezyon saptanmadı. Klinik olarak T1N0M0 luminal A olarak kabul edilen hastaya operasyon planlandı. Hasta covid-19 pandemi sürecinde kendi isteğiyle operasyona gelmedi. Takipsiz kalan hasta Aralık 2021'de tekrar genel cerrahi polikliniğine başvurdu. Yapılan mamografide sağ meme üst iç kadranda 29x22 mm boyutlarında solid kitle lezyon saptandı. Evreleme amaçlı çekilen PET/BT'de sağ memede primer kitle dışında lezyon saptanmadı. Klinik olarak T2N0M0 meme kanseri olan hastaya sağ meme lumpektomi ve sentinal lenf nodu biyopsisi yapıldı. Patoloji sonucu invaziv karsinom olarak sonuçlandı. İmmünohistokimyasal çalışmada; ER %100, PR %60, Cerb-B2 negatif, Ki67 %43 ve grade 3 olarak saptandı. Hasta pT2N0M0 evre 2A olması nedeniyle adjuvan endokrin tedavi başlandı.

Sonuç: Meme kanserlerinin yaklaşık %40'ı luminal A grubuna girmektedir. Luminal A meme kanserleri diğer tiplere göre daha yavaş büyüme eğilimindedir ve iyi prognoza sahiptir. Covid-19 pandemisi sürecinde hastaların tedavileri gecikebilmektedir. Meme kanserinde moleküler alt tipinin değerlendirilmesi tedavi ve prognoz açısından önemli olduğu unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: covid-19, luminal A