

[Abstract:0327][S-088][Diğer]

Bazal hücreli karsinomda vismodegib: tek merkez deneyimi

Erkan Özcan, İvo Gökmen, Fahri Akgül, İsmail Bayrakçı, Didem Divriklioğlu
Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi Tıbbi Onkoloji BD

Amaç: Bazal hücreli karsinom (BCC), nadir görülen ve yavaş büyüyen, düşük metastatik potansiyele sahip cilt kökenli tümördür. Primer tedavisi cerrahi olan bu tümörde sistemik tedavi seçeneği olarak vismodegib kullanılmaktadır. Çalışmamızda merkezimizde vismodegib verilen hastaları, klinikopatolojik özellikleri, objektif yanıt oranı (ORR), progresyonsuz sağkalım (PFS) ve genel sağkalım (OS) süreleri açısından inceledik.

Gereç-Yöntem: Mart 2013-Aralık 2022 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji bilim dalında lokal ileri veya metastatik BCC nedeni ile 1.basamak olarak vismodegib tedavisi alan 12 hasta çalışmaya dahil edildi. ORR; RECİST 1.1 kriterlerine göre, PFS, vismodegib tedavisi başlangıcından progresyona kadar geçen süre, OS ise vismodegib tedavisi başlangıcından ölüme kadar geçen süre olarak tanımlandı.

Bulgular: Primer lezyon, 12 hastanın 5 inde (% 41.7) baş boyuna, 4 ünde (%33.3) orbitaya 3 ünde (%25) ise diğer bölgelere yerleşimliydi. 1 hasta gorlin sendromu idi. 1 hasta radyoterapi almış iken 7 hasta cerrahi geçirmiş olup 5 hasta cerrahi geçirmemişti. Hastaların 8 i ((% 66.7) lokal ileri, 4 ü (% 33.3) metastatik hastalık olup 5 i (%41.7) de-novo metastatik iken 7 si (%58.3) nüks metastatik idi. 1 hastada tedavi altında progresyon, 2 hasta existus nedeni ile progresyon gelişti. Median takip süresi 75 ay, median PFS 44 ay, progresyon gelişmeyen hastalarda median ilaç kullanım süresi 23 ay idi.

Sonuç: Tüm hastalarda metastatik 1.seri tedavi olarak vismodegib kullanılmış olup parsiyel yanıt oranı % 83.3 idi.

Anahtar Kelimeler: bazal hücreli karsinom, cilt kanseri, vismodegib