

Anorektal mukozal malign melanom: Tek merkez deneyimi

Beliz Bahar Karaoğlu¹, Mehmet Ayhan Kuzu², İbrahim Ethem Geçim², Bülent Erkek², Cihangir Akyol², GÜNGÖR UTKAN¹, Ender Kalacı¹

¹Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara

²Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Anorektal malign melanom (ARMM) tüm melanom olgularının %1.3 ve tüm mukozal melanomların %16.5 kadarını kapsarken, tüm kolorektal kanserlerin %0.05'inden ve anal kanserlerin %1'inden sorumludur. Rektum, baş-boyun ve vulvovajinal bölgeden sonra üçüncü en yaygın mukozal malign melanom bölgesidir. Bu çalışmanın amacı, nadir görülen tümör olması nedeni ile kliniğimizde takipli rektal malign melanom tanılı hastaların özelliklerinin ve genel sağkalımlarının ortaya konmasıdır.

Gereç-Yöntem: ARMM tanısı ile 01.01.2018 ile 01.01.2023 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı'nda takip edilen 6 hastanın bilgileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, cerrahi ve onkolojik tedavi öyküleri, yaşayan hastaların son kontrol zamanı ve takip süreleri kayıt edildi.

Bulgular: Analize dahil edilen 6 hastanın (3 kadın ve 3 erkek) yaş ortalaması 63±12.7 olarak görüldü. Tanı anında hastaların %50'si metastatik olarak izlendi. Tanı anında metastazı olmayan 3 hastanın birine abdominoperineal rezeksiyon, diğer ikisine geniş eksizyon yapıldığı görüldü. Küratif cerrahi yapılan hastalardan birine adjuvan radyoterapi ve yüksek rekürrens riski nedeniyle adjuvan immunoterapi (Nivolumab) verildi. Tanıda metastatik olan hastaların ikisine palyatif radyoterapi uygulandı, komorbiditeleri ve performans skorları nedeniyle yalnızca bir tanesi sistemik kemoterapi alabildi. Tüm hastaların ortalama genel sağkalımı 6.7 (0.8-16.4) ay olarak görüldü.

Sonuç: Çalışmamızdaki bulgular literatür verileri ile uyumlu olarak saptanmıştır. ARMM nadir görülen ve takip ve tedavisi bireyselleştirilmiş olarak yapılan bir kanserdir. Tedavi ve hasta yönetimi konusunda büyük çaplı prospektif klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: anorektal melanom, mukozal melanom, rektal melanom

Tablo 1. Hastaların demografik ve klinik özellikleri

Özellikler	Sayı
Yaş, yıl (ortalama±SD)	63 ± 12,7
Cinsiyet, sayı (%)	
Kadın	3 (%50)
Erkek	3 (%50)
Başvuru şikayeti, sayı (%)	
Kanama	4 (%66,7)
Ağrı	2 (%33,3)
Kitle	0 (%0)
Metastaz durumu, sayı (%)	
Metastaz yok	2 (%33,3)
De novo metastatik	3 (%50)
Küratif cerrahi sonrası metastatik	1 (%16,7)
Küratif cerrahi, sayı (%)	
Yapılmadı	3 (%50)
	2 (%33,3)
	1 (%16,7)

Geniş lokal eksizyon Abdominoperineal rezeksiyon	
Radyoterapi, sayı (%)	2 (%33,3)
Yok	1 (%16,7)
Adjuvan	3 (%50)
Palyatif	
Sistemik tedavi, sayı (%)	3 (%50)
Aldı	3 (%50)
Almadı	
Genel sağkalım, ay (ortanca, min-max)	6,7 (0,8-16,4)