

[Abstract:0113][EP-008][Akciğer]


Denovo Beyin Metastatik Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Hastalarda Sistemik İnflamatuvar Cevap İndeksi'nin Prediktif Önemi

Mustafa Büyükkör, Fatih Tay, Necati Alkış

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anahtar Kelimeler: Küçük Hücreli Akciğer Kanseri, Beyin Metastazı, Sistemik inflamasyon, Yıllık Genel Sağkalım

Şekil 1.



DNBM KHAK hastalarda SİRİ belirtecinin 12 aylık sağkalımı tahminlemesindeki ROC analizi

Tablo 1.Hastaların klinikopatolojik özellikleri

Tablo 1. Hastaların klinikopatolojik özellikleri			Total n:42/(%)
Cinsiyet		Kadın	6 (14.3)
		Erkek	36 (85.7)
Yaş median (min-max)	61 (39-81)	≤60	19 (45.2)
		>60	23 (54.8)
Ecog		0	1 (2.4)
		1	27 (64.3)
		2	14 (33.3)
Sigara		Yok	1 (2.4)
		Var	41 (97.6)
Tanı sırasında veya takiplerde diğer uzak organ metastaz varlığı		Yok	8 (19.1)
		Var	34 (80.9)
Tanı Anında Vena cava superior sendromu (Vcss)		Yok	39 (92.9)
		Var	3 (7.1)
Uygulanan kemoterapi basamak sayısı		<2	32 (76.2)
		≥2	10 (23.8)
Palyatif WBRT		Yok	0 (0.0)
		Var	42(%100)
Hiponatremi		Yok	31 (73.8)
		Var	11 (26.2)
*Medyan OS (Overall Suvival)		≤60 yaş	6.5 ay
		>60 yaş	5.3 ay
		Total	5.6 ay

*Kaplan Meier sağkalım analizi

Tablo 2.12 aylık Genel Sağkalım

*12 aylık Genel sağkalım				
	Univariate Logistic Regression		Multivariate Logistic Regression	
	OR (CI 95%)	<i>p-Value</i>	OR (CI 95%)	<i>p-Value</i>
Hb	0.60 (0.36-1.01)	0.05	0.69 (0.40-1.19)	0.18
Total Bilirubin	0.21 (0.01-2.38)	0.21	0.35 (0.02-5.78)	0.46
Kalsiyum	0.36 (0.10-1.27)	0.11	0.24 (0.04-1.38)	0.11
Siri >1.79	1	0.08	1	0.04
	4.00 (0.83-19.10)		8.00 (1.08-58.90)	
			R ² = 0.38, -2loglikelihood= 31.57	

^aLojistik regresyon analizi