


[Abstract:0163][EP-036][Meme]

Metastatik meme kanserli hastalarda ikinci basamak tedavi sonuçları


Beyza Ünlü, Yaşar Culha, Sena Ece Davarcı, Duygu Özaşkın, Hacer Demir, Meltem Baykara
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji, Afyon

Anahtar Kelimeler: metastatik meme kanseri, tedavi

Şekil 1: İkinci seri tedavi türü



Şekil 2: Reseptör durumuna göre PFS



Tablo 1: Metastatik ikinci basamak kemoterapi sonrası PFS

Kemoterapi rejimi (N)	Median PFS (ay) [Confidence interval]
Taksan (17)	9,7 (7,3-12,0)
Kapesitabin (17)	3,5 (2,7-4,2)
Gemsitabin (1)	1,6
Platin-taksan (4)	1,4 (0-8,5)
T-DM1 (12)	6,1 (5,0-7,2)
Lapatinib-kapesitabin (5)	7,1 (0-15,0)
Taksan-herceptin (8)	5,4 (0-12,6)
Kapesitabin-herceptin (2)	7,9
Vinorelbin-herceptin (3)	6,0 (5,2-6,9)
HT-herceptin (3)	6,2 (0,3-12,1)
HT (31)	6,6 (4,7-8,4)
CDK4/6-HT (13)	5,8 (1,5-10,1)
Everolimus-exemestan (2)	16,8
Diğer (8)	5,9 (1,1-10,7)
Overall	6,5 (5,1-7,8)