

[Abstract:0181][EP-048][Meme]

Metastatik Meme Kanserinde Ribosiklib Kaynaklı Akut Pankreatit

Muzaffer Uğraklı¹, Muhammed Muhiddin Er¹, Engin Hendem¹, Mehmet Zahid Koçak¹, Dilek Çağlayan¹, Ali Fuat Gürbüz¹, Oğuzhan Yıldız¹, Melek Karakurt Eryılmaz¹, Murat Araz¹, Mehmet Asıl², Ülkü Kerimoğlu³, Mehmet Artaç¹

¹Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

²Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

³Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Radyoloji Bilim Dalı

Anahtar Kelimeler: meme kanseri, ribociclib, akut pankreatit, CDK 4/6 inhibitorleri


RESİM-1



İntravenöz kontrast madde verilmesini takiben elde edilen aksiyel bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüsünde pankreatite bağlı pankreatik kanalın dilatasyonu ile ilişkili olarak pankreas gövdesi ve kuyruğunda parankimal hipodens, ödemli

değişiklikler görülmektedir. Pankreas kanalı pankreas gövdesine kadar genişlemiştir (ok). Pankreas başının yoğunluğu normaldir. İntrahepatik safra kanalı dilatasyonu görülmez.

RESİM-2



Güne göre amilaz değeri grafiği. Ribosiklib tedavisi 12.05.2020 tarihinde başlamış olup, 24.06.2020 tarihinde ilk kez amilaz testinde artış tespit edilmiştir. İlk belirti 01.07.2020 tarihinde, ikinci belirti ise 10.07.2020 tarihinde ortaya çıktı. Ribosiklib ilk olarak 01.07.2020 tarihinde kesildi ve 03.07.2020 tarihine kadar kullanılmadı. 04.07.2020 tarihinde hasta kendi isteği üzerine ribociclib'e yeniden başlamış; 10.07.2020 tarihinde semptomların tekrarlaması üzerine ribociclib kullanımı sonlandırılmıştır.

RESİM-3



Güne göre lipaz değeri grafiği. Ribosiklib tedavisi 12.05.2020 tarihinde başlamış olup, 24.06.2020 tarihinde ilk kez amilaz testinde artış tespit edilmiştir. İlk belirti 01.07.2020 tarihinde, ikinci belirti ise 10.07.2020 tarihinde ortaya çıktı. Ribosiklib ilk olarak 01.07.2020 tarihinde kesildi ve 03.07.2020 tarihine kadar kullanılmadı. 04.07.2020 tarihinde hasta kendi isteği üzerine ribociclib'e yeniden başlamış; 10.07.2020 tarihinde semptomların tekrarlaması üzerine ribociclib kullanımı sonlandırılmıştır.

tablo-1

LABORATORY TEST	RESULT
EBV IG-M	Negative
EBV IG-G	Positive
HBsAg	Negative
Anti-HCV	Negative
Anti-HIV	Negative
CMV IG-M	Negative
CMV IG-G	Negative
Parvovirus B19 IG-G	Positive
Parvovirus B19 IG-M	Positive
Toxoplasmosis IG-M	Negative
Toxoplasmosis IG-G	Negative
Rubella IG-M	Negative

Rubella IG-G	Positive
Mumps IG-G	Negative
Measles IG-G	Negative

Tablo 1: Pankreatit etiyolojisini belirlemek için viral laboratuvar testleri. EBV: Epstein–Barr virüsü, IG: İmmünoglobulin, HBsAg: Hepatit B yüzey antijeni, Anti-HCV: Hepatit C virüsüne karşı antikor, Anti-HIV: Anti-insan immün yetmezlik virüsü, CMV: sitomegalovirüs