

[Abstract:0196][EP-057][Meme]

Meme kanseri olgularında insülin direncinin klinikopatolojik parametrelerle ilişkisi

Duygu Özaşkın, Yaşar Çulha, Sena Ece Davarcı, Beyza Ünlü, Hacer Demir, Meltem Baykara
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Afyon, Türkiye

Anahtar Kelimeler: homa, insülin direnci, meme kanseri

Tablo-1 Hastaların Demografik Özellikleri

Özellik		Özellik	
Yaş, yıl, ortalama (SD)	59 (30-88)	Grade, n (%)	
Cinsiyet, n (%)		Grade 1	11 (16,2)
Kadın	68 (100)	Grade 2	36 (52,9)
Erkek	0(0)	Grade 3	20 (29,4)
Beden Kitle indeksine göre sınıflama, n (%)		Bilinmiyor	1 (1,5)
18.5 kg/m2 ile 24.9 kg/m2 arası	18(26,5)	Lenfovasküler İnvazyon, n (%)	
25 kg/m2 ile 29.9 kg/m2 arası	19(27,9)	Var	35 (51,5)
30 kg/m2 ile 39.9 kg/m2 arası	29(42,7)	Yok	19 (27,9)
40 kg/m2 ya da üzeri	2(2,9)	Bilinmiyor	14 (20,6)
Aile Öyküsü, n (%)		Perinöral İnvazyon, n (%)	
Var	54 (20,6)	Var	15 (22,1)
Yok	14 (79,4)	Yok	39 (57,4)
Prezentasyon, n (%)		Bilinmiyor	14 (20,5)
Tarama	10 (14,7)	Tanı Evresi, n (%)	
Ele gelen kitle	49 (72,1)	Evre 1	12 (17,6)
Ağrı	3 (4,4)	Evre 2	29 (42,6)
Diğer	6 (8,8)	Evre 3	14(20,6)
Histolojik Tip, n (%)		Evre 4	13 (19,2)
Duktal Karsinom, NOS	62 (91,2)	Menopoz Durumu, n (%)	
İnvaziv Lobüler Karsinom	2 (2,9)	Premenopoz	27(39,7)
Mikst	1 (1,5)	Postmenopoz	41 (60,3)
Diğer	3 (4,4)	Cerrahi Tipi, n (%)	
Meme Tarafı, n (%)		MKC	24 (35,3)
Sağ	39 (57,4)	MRM	31(45,6)
Sol	28 (41,2)	Ameliyat olmayan	13 (19,1)
Bilateral	1(1,4)	Homa-IR, n (%)	
Hormon Reseptör Durumu, n (%)		Homa-IR 2,5 ve altında olanlar	29 (42,6)
Negatif	11 (16,2)	Homa-IR 2,5 üzerinde olanlar	39 (57,4)
Pozitif	57 (83,8)	Toplam, n (%)	68 (100)
Her-2 Durumu, n (%)			
Negatif	54 (79,4)		
Pozitif	14 (20,6)		