

[Abstract:0249][EP-082][Genitoüriner sistem]

Kabazitaksel ile Tedavi Edilen Prostat Kanseri Hastalarında Prognostik Bir Faktör: Bazal Nötrofil Lenfosit Oranı


Hakan Taban¹, Mustafa Erman²

¹Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Samsun


²Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevanatif Onkoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: kabazitaksel, nötrofil lenfosit oranı, prognoz, prostat kanseri

Bazal Nötrofil Lenfosit Oranına Göre Genel Sağkalım Grafiği



Bazal Nötrofil Lenfosit Oranına Göre Progresyonsuz Sağkalım Grafiği



Hastaların Bazal Özellikleri

	n=98 (%)
Tanı yaşı (medyan, IQR)	61.0 (55.6 – 66.8)
<70	87 (%88.8)
>=70	11 (%11.2)
Tanıda metastatik olma durumu	
Evet	61 (%62.2)
Hayır	37 (%37.8)
Gleason skoru (n=81)	
<8	15 (%18.5)
>=8	66 (%81.5)
Prostat cerrahisi	
Evet	13 (%13.3)

Hayır	85 (%86.7)
Definitif veya kurtarma radyoterapisi	
Evet	21 (%21.4)
Hayır	77 (%78.6)
Orşiektomi	
Evet	24 (%24.7)
Hayır	73 (%75.3)
Dosetaksel kür sayısı - medyan	8 (3 - 32)
NLR	
NLR ≤ 2.6	50 (%51.0)
NLR > 2.6	48 (%49.0)

Kabazitaksel Tedavisi Dönemi Hasta Özellikleri

	n=98 (%)
Tedavi başlanma yaşı (medyan, IQR)	65.9 (59.3 – 72.7)
<70	67 (%68.4)
≥70	31 (%31.6)
PSA düzeyi ng/ml (medyan, IQR)	85 (41.8 – 202.0)
Viseral metastaz	
Evet	32 (%32.7)
Hayır	66 (%67.3)
Kemik metastazı	
Evet	88 (%89.8)
Hayır	10 (%10.2)
Lenf nodu metastazı	
Evet	71 (%72.4)
Hayır	27 (%27.6)
Kabazitaksel kür sayısı - medyan	8 (1 - 36)
PSA yanıtı olan hastalar (%50'den fazla düşme)	44 (%44.9)
Toksisite nedeniyle mortalite	10 (%10.2)