

Opere mesane kanserinde periferik kan immün hücre oranlarının değişimi erken nüksü öngörebilir

Rumeysa Çolak¹, Gökmen Umut Erdem², Caner Kapar¹, Faruk Aksu², İlkey Gültürk¹, Gülçin Şahingöz Erdal¹, Mesut Yılmaz¹, Deniz Tural¹

¹Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilimdalı, İstanbul

²Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilimdalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: mesane, nötrofil-lenfosit oranı, nüks

hasta özellikleri

Yaş (Mean±SD)	60.5 ± 8.3
<60y (s,%)	44 (48.3)
>60y (s,%)	47 (51.7)
Cinsiyet (s,%)	
Erkek	80 (87.9)
Kadın	11 (12.1)
TUR-Grade (s,%)	
Low Grade	7 (7.6)
High Grade	83 (91.2)
T evresi (s,%)	
T(1-2)	52 (%57.1)
T(3-4)	39 (%42.9)
LN (s,%)	
Negatif	71 (78.0)
Pozitif	20 (22.0)
Aduvan Kemoterapi(s,%)	
Hayır	73 (80.2)
Evet	18 (19.8)
N/L oranı (Mean±SD)	2.8
<3 (s,%)	58 (53.4)
>3 (s,%)	33 (48.5)

Tablo 1: Hasta Özellikleri