

[Abstract:0360][EP-140][Diğer]

Sistemik tedavi alan kanser hastalarında CoronaVac aşısının IgM ve IgG antikor yanıtının prospektif olarak değerlendirilmesi

Yakup İriağaç¹, Berna Erdal², Eyyüp Çavdar¹, Kubilay Karaboyun¹, Okan Avcı¹, Aliye Çelikkol³, Halil Taşkaynatan⁶, Özkan Alan⁵, Sonat Pınar Kara⁴, Erdoğan Selçuk Şeber¹

¹Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji

²Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Mikrobiyoloji

³Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Biyokimya

⁴Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İç Hastalıkları

⁵Koç Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji

⁶Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji

Anahtar Kelimeler: covid-19, inaktif covid-19 aşısı, sistemik tedavi

Tablo 1: Katılımcıların karakteristikleri (n=92)

	N	(%)
Yaş		
• 60 altı	47	51,1%
• 60 ve üstü	45	48,9%
Cinsiyet		
• erkek	35	38,0%
• kadın	57	62,0%
Kardiyovasküler Hastalık*		
• Evet	38	41,3%
• Hayır	54	58,7%
Diabetes mellitus		
• Evet	26	28,3%
• Hayır	66	71,7%
Kronik akciğer hastalığı		
• Evet	12	13,0%
• Hayır	80	87,0%

Tablo 2:SARS-COV-2 IgM ve SARS-CoV-2 receptor-binding domain (RBD) specific IgG sonuçlarını predikte eden değişkenlerin, univariate logistik resyonyon analizi

		SARS-COV-2 IgM		RBD specific IgG	
Değişkenler	Kategori	OR (95% CI)	p	OR (95% CI)	p
Yaş	Sürekli	1.01 (0.97-1.05)	0.646	0.85(0.7280.99)	0.03
Cinsiyet	Erkek / Kadın	0.77 (0.29-2.07)	0.606	1.69(0.32-8.87)	0.54
CVD	Yok/Var	1.07 (0.41-2.91)	0.869	0.69(0.13-3.60)	0.66
DM	Yok/Var	0.74 (0.24-2.29)	0.607	0.77(0.13-4.51)	0.78
CRD	Yok/Var	1.15 (0.28-4.69)	0.848	0.26(0.04-1.63)	0.15
2.doz aşı sonrası gün	Sürekli	1.04 (0.97-1.10)	0.267	1.02(0.93-1.13)	0.64
RBD specific IgG	Negatif/Pozitif	>100 (NA)	0.998		
SARS-COV-2 IgM	Negatif/Pozitif			>100 (NA)	0.998

CVD: kardiyovasküler hastalık DM: diabetes mellitus CRD: Kronik akciğer hastalığı, NA: Not-Applicable

-----**END**-----

page time:0,671875 sec