

[Abstract:0204][S-042]

İmmün check point inhibitörü tedavisi alan Türk metastatik melanom hastalarında etkinlik ve güvenlik gerçek yaşam verileri incelemesi: Bir Türk Onkoloji Grubu Çalışması

Alpaslan Özgün¹, İzzet Doğan², Melek Karakurt Eryılmaz³, Atike Pinar Erdoğan⁴, Murat Ayhan⁵, Emre Hafizoğlu⁶, Pınar Kubilay Tolunay⁷, Eyyüp Çavdar⁸, Gökçen Tuğba Çevik⁹, Hacer Demir¹⁰, Özgecan Dülger¹¹, Bahiddin Yılmaz¹²

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, İstanbul

²İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji Kliniği, İstanbul

³Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Konya

⁴Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Manisa

⁵Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, İstanbul

⁶Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara

⁷Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Tekirdağ

⁸Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Tekirdağ

⁹Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Uşak

¹⁰Afyon Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Afyon

¹¹Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, İstanbul

¹²Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Samsun

Amaç: Metastatik melanomun tedavisinde son yıllarda immün check point inhibitörleri ile çok önemli bir başarı sağlanmış olup, hastaların sağkalım süresi belirgin bir şekilde uzamıştır. Ancak bu alanda klinik çalışma dışı olan ve günlük pratiği yansıtan çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, klinik çalışma dışı olan, ileri yaş ve beyin metastazı gibi kötü prognostik faktörlü hastaları da içeren Türk metastatik melanom hastalarında immün check point inhibitörü tedavisinin etkinliğini ve güvenliğini incelemektir.

Gereç-Yöntem: Bu çalışma için Türkiye'deki 23 kanser merkezinde metastatik melanom tanısı ile immün check point inhibitörü tedavisi alan 249 hasta retrospektif olarak incelendi. Tedavinin etkinliği ve güvenliği araştırıldı. Prognosta etki eden faktörler incelendi.

Bulgular: İmmün check point inhibitörü tedavisi ile objektif yanıt oranı (ORR) % 37,7 bulundu. Median genel sağkalım (OS) 61 ay idi. Median OS arasındaki fark; yaş, objektif yanıt durumu, metastaz şekli ve beyin metastazı varlığı yönünden istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Median OS 70 yaş ve altı hastalarda 67 ay, 70 yaş üstü hastalarda 35 ay ($p=0,02$); objektif yanıt alınan hastalarda median OS'ye ulaşamamış iken, objektif yanıt alınamayan hastalarda 41 ay ($p<0.0001$); de novo metastatik hastalarda 35 ay, rekürrens şeklinde metastaz görülen hastalarda 78 ay ($p<0.0001$); beyin metastazı olan hastalarda 37 ay, beyin metastazı olmayan hastalarda 67 ay ($p=0.006$) bulundu. Çok değişkenli analiz sonucunda, objektif yanıt olmaması durumu, de novo metastaz varlığı ve beyin metastazı varlığının diğer faktörlerden bağımsız olarak sağkalım üzerine etkili olan kötü prognostik faktörler olduğu gösterildi. Grade 3-4 immün ilişkili yan etkiler hastaların % 7,2'sinde görüldü.

Sonuç: Çalışmamız göstermiştir ki; Türk metastatik melanom hastalarında immün check point inhibitörü tedavisinin gerçek yaşam verileri, ülkemiz koşulları nedeniyle, diğer çalışmaların sonuçlarına göre bir miktar farklılık göstermektedir. Bunun yanında, çalışmamız klinik çalışma dışı hastaları da kapsadığı için farklı prognostik faktörleri ortaya çıkaran önemli bir çalışma olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Metastatik melanom, immün check point inhibitörleri, prognostik faktörler