

[Abstract:0109][EP-015]

Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Neoadjuvan Kemoterapiye Tam Yanıtı Etkileyen Faktörler

Esra Sazimet Kars

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Mersin

Amaç: Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir ve bir numaralı kansere bağlı ölüm nedenidir. Bu çalışma merkezimizde takip edilen metastatik meme kanseri (MMK) tanılı hastaların neoadjuvan dönemde verilen kemoterapinin tam yanıtını etkileyen faktörleri araştırmayı hedeflemiştir.


Gereç-Yöntem: Bu çalışmaya ilk tanı anında metastaz saptanan, yeterli klinik ve izlem verisi bulunan meme kanserli toplam 40 hasta alındı. Primer tümörün biyolojik özellikleri immunohistokimyasal yöntemle değerlendirildi. Ayrıca histolojik ve nükleer derece, hasta yaşı, viseral metastaz durumu ve performans durumu gibi parametrelerin sağkalım üzerine etkisi araştırıldı.

Bulgular: Medyan genel sağkalım süresi 39 ay (%95 güven aralığı: 27.6-50.4) bulundu. Tek değişkenli analizde genel sağkalımı olumsuz etkileyen faktörlerin düşük performans durumu ve viseral metastaz görülmesi olduğu saptandı ($p \leq 0.05$).


Sonuç: Genel sağkalım için yapılan çok değişkenli analizde, genel sağkalımı olumsuz etkileyen en önemli faktörlerin düşük performans durumu, hormon reseptör negatifliği ve viseral metastaz varlığının olduğu gösterildi ($p \leq 0.05$).

Anahtar Kelimeler: meme kanseri, kemoterapi, neoadjuvan

HR + ve HR- genel sağkalım analizi ve visseral met+ ve vis met- genel sağkalım analizi




Şekil 2. HR pozitif (n=22) ve HR negatif (n=21) hasta gruplarının genel sağkalım açısından karşılaştırılması: HR pozitif hastaların sağkalım sonuçları daha iyi bulundu ($p=0.10$).



Şekil 3. Viseral metastazı olmayan (n=19) ve viseral metastazı olan (n=25) hasta gruplarının genel sağkalım açısından karşılaştırılması: viseral metastazı olmayan hastaların sağkalım sonuçları daha iyi bulundu ($p=0.05$).

Performans Durumuna(PD) göre sağkalım



Şekil 1. PD = 0-1 (n=39) ve PD = 2-3 (n=5) hasta gruplarının genel sağkalım açısından karşılaştırılması: iyi PD'na sahip hastaların sağkalım sonuçları daha iyi bulundu ($p=0.002$).