

[Abstract:0135][EP-028]

Küçük hücreli akciğer kanserinde (KHAK) sisplatin ve karboplatin karşılaştırması: Tek merkez Deneyimi

Serife Sivridemir, Efe Hasdemir, Mehmet Nezir Ramazanoğlu, Aydan Farzaliyeva, Samed Rahatlı, Arzu Oğuz, Zafer Akçalı, Özden Altundağ
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, ANKARA

Amaç: KHAK'nin tedavisinde mevcut standart tedavi için sınırlı evreli hastalar için eş zamanlı kemoradyoterapi ve yaygın evreli SCLC için kemoimmünoterapidir. Sisplatin her iki durumda da tercih edilen ilaçtır. Sisplatin birinci düzey kanıtlarla standart tedaviyi oluştursa da günlük pratikte karboplatin daha güvenilir toksisite profili nedeniyle tercih edilmektedir.

Gereç-Yöntem: Karboplatinin her iki endikasyonda da sisplatinden daha az etkili olmadığını araştırmak için 2011-2021 yılları arasındaki verilerimizi retrospektif olarak analiz ettik. OS'yi incelemek ve karşılaştırmak için log-rank testleri ile Kaplan-Meier sağkalım analizleri yapıldı.

Bulgular: Toplamda 113 hasta analiz edildi. 62 (%54,9) hastaya karboplatin+etoposid, 51 (%45,1) hastaya sisplatin+etoposid uygulandı. Median yaş karboplatin ve sisplatin hastalarında sırasıyla 70 ve 59,5 idi ($p<0,001$). Çok değişkenli analizler karboplatin alan hastaların ECOG PS'sinin daha kötü olduğunu gösterdi ($p=0,011$). Her iki gruptaki medyan OS (Carbo vs Cis), sınırlı evrede (29,37 vs 27,77 ay $p=0,52$) ve yaygın aşamada (10,79 vs 9,83 ay $p=0,64$) benzerdi.

Sonuç: Sisplatin hem sınırlı hem de yaygın evre KHAK'de hala temel ilacı olmasına rağmen, benzer hayatta kalma ve tolere edilebilir toksisite avantajı nedeniyle karboplatin tercih edilebilecek bir ilaçtır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer, Karboplatin, Sisplatin