

[Abstract:0139][EP-030]

Meme- Over Kanseri ile Dermatomiyojit/Polimiyojit Birlikteliği ve Klinik Prezantasyonu

Suheda Atas İpek, Hatice Asoğlu Rüzgar, Esra Asarkaya, Ertuğrul Bayram
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Adana

Meme- Over Kanseri ile Dermatomiyojit/Polimiyojit Birlikteliği ve Klinik Prezantasyonu

Suheda Atas İpek, Esra Asarkaya, Hatice Asoğlu Rüzgar, Ertuğrul Bayram

Amaç: Meme ve over kanseri kanseri kadınlarda en sık görülen malignitelere ve Dermatomiyojit(DM) /Polimiyojit (PM) varlığında bu risk 6 kat fazla artmaktadır. Hastalıkta bulunan anti-TIF1, anti-NXP2, anti-Jo-1 gibi antikörlerin hem tümör hücrelerinde hem de DM/PM'li dokularda gözlenmesi bu artıştan sorumlu tutulmaktadır. Merkezimizde meme -over kanseri tanısı alan DM/PM birlikteliği olan hastaları ve klinik prezentasyonlarını sunmayı amaçladık.

Yöntem: Hastanemize 2014-2024 yılları arasında başvuran DM/PM tanısı alan 90 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastalardan 15 tanesinde eşlik eden malignite saptandı. Malignite saptanan hastalardan meme-over kanserli hastalar çalışmaya alındı.

Bulgular: Çalışmamızda DM/PM tanısı alan hastaların %17 sinde malignite saptandı. Malignite tanısı konan hastaların dağılımı Meme kanseri 3, over kanseri 2, nazofarinks kanseri 2, NHL 2, kolon kanseri 2, KLL 2 ve cilt kanseri 2 hasta şeklindeydi. En sık gözlenen malignite %33 ile meme-over kanseriydi. Meme-over kanser tanılı hastaların en küçük yaş 23 en büyük yaş 69 olup yaş ortalaması 55.8 idi. Hastaların beşi postmenopozaldi. Tanı alan dört hastada DM, bir hastada PM birlikteliği vardı. Hastalardan üçü malignite tanısı konduktan sonra, bir hasta eş zamanlı DM tanısı aldı ve bir hasta önce PM sonra meme kanseri tanısı aldı. Meme kanseri hastalarının 2'si HR(+) HER2 negatif, bir hasta HR(-) HER2 pozitif ve bir hasta da triple negatif saptandı. Over kanseri tanısı alan iki hastada platin dirençliydi. Hastalarda BRCA mutasyonları saptanmadı. Hastaların hepsi ileri evre ve tedaviye refrakterdi ve iki hasta takiplerinde exitus oldu.

Sonuç: DM/PM hastalarında en sık gözlenen malignite meme-over kanserleridir. DM/PM bu hastalarda agresif seyir azalmış sağkalım ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: DM;dermatomiyojit, PM;polimiyojit