

[Abstract:0326][EP-118]

Testis Tümörlerinin Klinikopatolojik ve Demografik Analizi: Tek Merkez Deneyimi

Yakup Düzköprü, Abdülkadir Koçanoğlu, Serkan Gülcü
Etlik Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Ankara

Amaç: Testis kanserleri, genç erkeklerde en yaygın görülen katı tümörler arasında yer almaktadır. Bu vakaların büyük bir kısmını germ hücreli tümörler oluşturmakta ve seminomlar en yaygın histolojik alt tip olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışma, testis tümörü tanısı konulan hastaların klinik-demografik profillerini ve bu grup içindeki histopatolojik alt tiplerin dağılımını incelemeyi amaçlamaktadır.

Gereç-Yöntem: Çalışmaya, 2008-2022 yılları arasında testis tümörü tanısı alan ve kliniğimizde takip edilen 18 yaş ve üstü hastalar dahil edildi; ikinci malign tümörü olan hastalar hariç bırakıldı. Hastaların klinik ve patolojik verileri kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya toplam 95 hasta dahil edildi. Germ hücreli tümörlerin median başlangıç yaşı 29 olarak belirlendi. Vakaların içinde, non-seminomatöz tümörler %53,6, seminomlar ise %44,3 oranında bulundu. Non-seminomatöz tümörler içinde, en sık rastlanan alt tip, vakaların %45,4'ünü oluşturan mix germ hücreli tümörler olarak belirlendi. Testis tutulumu çoğunlukla sağ testiste (%56,7) görülürken, sol testis (%42,3) ve çift taraflı tutulum nadirdi (%1). Evre 1'de tanı konulan hastaların oranı %56,7 olarak saptandı.

Sonuç: Testis tümörleri, genç erkekler arasında önemli bir sağlık endişesi olmaya devam etmektedir. Bu çalışmanın bulgularına göre, seminomlar baskın histolojik alt tip olarak öne çıkmaktadır. Hastaların büyük bir kısmının erken evrede tanı aldığı gözlemlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Testis kanseri, Germ hücreli neoplaziler, Seminom, Nonseminomatöz germ hücreli tümörler