

[Abstract:0328][EP-120]

Birden fazla moleküler deęişim gösteren üçlü negatif meme ve ALK pozitif akcięer kanseri, olgu sunumu

Didar Şenocak, Eriş Özkan, Mina Karakullukçu, Oğuz Bilgi, Mehmet Alpaslan Özgün
Saęlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eęitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji
Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda en sık gözlenen ve mortalitesi en yüksek kanserlerden birisi olup, üçlü negatif meme kanseri daha yüksek nüks riski ve kötü prognoz ile karakterizedir. Burada metastatik çoklu kez hormon reseptör deęişikliği sergileyen ve takibinde Anaplastik Lenfoma Kinaz (ALK) pozitif akcięer adeno kanseri gelişen üçlü negatif meme kanserli bir hastayı sunuyoruz.

Olgu: 54 yaşında kadın hasta; saę meme de kitle nedenli yapılan biyopsi sonucu invaziv duktal karsinom (IDC) tanısıyla opere edildi. Patolojisi IDC; ER (-), PR(-), HER-2 (-) tümör 1,5 cm idi. Hastaya AC (adriamisin,siklofosfamid),sonrasında haftalık paklitaksel ve radyoterapi uygulandı. Kontrolde saę akcięer üst lopta 1.4 cm çapında kitle gelmesi üzerine yapılan biyopsi sonucu ALK (+) adenokanser tanısı koyuldu. Adjuvan 4 kür sisplatin,vinorelbin tedavisi verildi. Kontrol pozitron emisyon tomografisi (PET-CT) 'nde bilateral servikal lenf nodlarında ve saę meme de şüpheli nodül gelen hastanın servikal biyopsisi ALK (-) akcięer adeno kanseri metastazı,meme biyopsisi üçlü negatif IDC geldi. Karboplatin, paklitaksel tedavisi başlandı. Kontrol PET-CT 'de saę supraklavikular bölgede yeni lenf nodu metastazının ekzisyonu tekrardan ALK (+) akcięer adenokanser metastazı ile uyumlu geldi. Alektinib başlandı. Takibinde saę memedeki lezyonda progresyon saptanan hastadan alınan biyopsi sonucu hormon negatif, HER-2(+) IDC geldi. Modifiye radikal mastektomi yapıldı. AC, sonrasında trastuzumab tedavisi planlanan hasta alerjik reaksiyon nedenli tedavilerini tamamlayamadı. Kontrolde karacięerde yeni metastatik lezyonlar saptandı, biyopsisi üçlü negatif meme kanseri metastazıyla uyumluydu.3 kür kapesitabin kullanıldı. Kontrolde karacięer ve akcięer lezyonlarında progresyon saptandı.Yapılan biyopsi sonuçları karacięerde üçlü negatif meme kanseri, akcięerde de ALK(+) adeno kanser metastazı ile uyumlu gelmesi üzerine sacituzumab govitakan ve lorlatinib başlandı ve hastanın takibine devam ediliyor.

Sonuç: Metastatik meme kanserinin tedavisinde, primer ve metastatik lezyonların takibinde moleküler profil deęişikliği söz konusu olup; vakamızda olduęu gibi hastalığın tedavi ve prognozunu deęiştirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Üçlü negatif meme kanseri, akcięer kanseri, moleküler deęişim