

[Abstract:0359][EP-134]

Nadir Görülen Bir Meme Kanseri Türü: Küçük Hücreli Primer Meme Kanseri

Uğur Özkerim, Zeynep Yüksel

Kartal Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Memenin primer nöroendokrin karsinomu (NEBC) nadir görülen bir tümördür. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2012 sınıflandırmasında bu tümörler 3 grupta sınıflandırılmıştır: 1- nöroendokrin tümör, iyi diferansiye; 2- nöroendokrin karsinom, kötü diferansiye/küçük hücreli karsinom; ve 3- nöroendokrin farklılaşma ile invaziv meme karsinomu. Biz de nadir görülen bir küçük hücreli primer meme kanseri olgumuzu sunmayı planladık.

Olgu: 60 yaşında post-menapozal kadın; sağ memede kitle nedeniyle yapılan tetkiklerinde sağ meme de 23x17x22 mm boyutlarında hipoechoik solid kitlesel lezyon saptanmış yapılan tru-cut biyopside az diferansiye karsinom, östrojen reseptörü (ER), Progesteron reseptörü (PR) ve İnsan epidermal büyüme faktör reseptörü (HER2) negatif; ki 67 oranı %70 olarak bulunmuş ileri incelemede küçük hücreli karsinom ile uyumlu görülmüş. Bunun üzerine primerini tespit etmek amacıyla ileri inceleme yapıldı. Çekilen pozitron emisyon tomografisinde (PET) sağ memede 17 mm hipermetabolik malign lezyon ve bilateral aksiller subsantimetrik hipometabolik lenf nodları dışında patolojik bulgu tespit edilmedi. Yapılan tetkikler sonucunda memenin primer küçük hücreli karsinomu tanısı kondu. Hasta onkolojik cerrahi konseyinde değerlendirildi ve neoadjuvan kemoterapi kararı verildi bunun üzerine cisplatin 75 mg/m² D1 Etoposide 100 mg/m² D1-3 21 günde bir kemoterapisi başlandı. 6 kür tedavi verildi tedavi sonrası yanıt değerlendirme için kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve PET istendi. PET’de tedaviye iyi derece parsiyel tanıt saptandı. Kraniyal MRG’de ise metastaz yoktu tekrar konseyde değerlendirilen hastaya cerrahi kararı alındı. Hastaya 05/01/2022 de sağ meme eksizyonu+sentinel lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Tümör boyutu 3x3x2 cm idi lenf nodu metastazı yoktu. Neoadjuvan tedavi yanıtı yoktu. Radyoterapi tamamlandıktan sonra hastaya dört kür adriamisin-siklofosfamid planlandı. Cisplatin-etoposide dirençli olan hastanın haftalık paklitaksel tedavisi 18/08/2022 tarihinde tamamlanmış olup tedavi sonrası pet/ct de nüks veya metastaz bulgusu saptanmamış olup hasta 1,5 yıldır remisyonda takibe devam etmektedir.

Sonuç: NEBC tanısı hastaların klinik, radyolojik ve patolojik olarak bir bütün bir inceleme sonrası konulması gerekir. Tedavisi klasik meme kanserleri gibi değil diğer yüksek gradlı NEK’ler gibi yapılmalıdır. Ne yazık ki yapılan tedavilere rağmen prognozu kötü olan bir meme kanseri alt tipidir.

Anahtar Kelimeler: HER2, İnsan epidermal büyüme faktör reseptörü, NEK, Nöroendokrin karsinom