

[Abstract:0379][EP-145]

Vaka bildirim: Axitinib ilişkili myokardial enfarktüs

Baris Koksal, Elvin Chalabiyev

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, MEDİKAL ONKOLOJİ BİLİM DALI, ANKARA

Amaç: Tirozin kinaz inhibitörleri hedefe yönelik tedavi seçeneği olarak farklı kanser türlerinde kullanılmaktadır. Bu grup ilaçların kanser tedavisinde kullanımları her geçen gün artmakla birlikte yan etkileri de rapor edilmeye başlamıştır. En sık görülen yan etkiler myokardiyal iskemi, kalp yetmezliği, QT uzaması ve hipertansiyon gibi kardiyak yan etkiler olarak bilinmektedir. Biz bu bildiride Regorafenib ilacına bağlı myokardiyal enfarktüs vakası sunacağız.

Olgu: 70Yaş/ Kadın hasta, HT, Tip-2 Diabetes Mellitus tanısı mevcut

2012 yılında hematüri şikayeti ile başvurduğunda sol böbrek renal hücreli kanser (RCC) tanısı almış.Lokalize hastalık nedeniyle sol nefrektomi yapılmış.Adjuvan tedavi almamış.Takipte 2014 yılında meme kanser nedeniyle opere edilmiş.Adjuvan Kemoradyoterapi sonrası hormonterapi (Tamoksifen) devam edilmiş. 2018 yılında nefes darlığı şikayeti ile başvurduğunda sol akciğer apeksde kitle görünümü saptanmış.Biopsi sonucu:RCC metastazı olarak gelmiş.Cerrahi yapılan hastada lokal nüks olması üzerine pazopanib tedavisi başlanmış, ancak hastalık progrese olunca Nivolumab + Axitinib tedavisi başlanmış. Axitinib tedavisinin 3.ayında göğüs ağrısı, nefes darlığı şikayeti ile hastane başvurusunda Akut Myokard enfarktüsü saptanması üzerine Koroner angiografi sonrası STENT implantasyonu yapılmış ve Axitinib tedavisi kesilerek Nivolumab tedavisine devam edilmiş.

Sonuç: Tirozin kinaz inhibitörleri hedefe yönelik tedavi seçeneği olarak farklı kanser türlerinde kullanılmaktadır. Bu grup ilaçların kanser tedavisinde kullanımları her geçen gün artmakla birlikte yan etkileri de rapor edilmeye başlamıştır. En sık görülen yan etkiler myokardiyal iskemi, kalp yetmezliği, QT uzaması ve hipertansiyon gibi kardiyak yan etkiler olarak bilinmektedir.

Anahtar Kelimeler: axitinib, akut MI, renal hücreli karsinom