

[Abstract:0401][EP-158]

Kastrasyona duyarlı metastatik prostat kanseri olgusunda enzalutamide baęlı interstisyel akcięer hastalıęı: Nadir bir olgu sunumu

Şendaę Yaşlıkaya, İsmail Oęuz Kara
Çukurova Üniversitesi Medikal Onkoloji Klinięi, Adana

Giriş: Bir androjen reseptör sinyal inhibitörü olan Enzalutamid, metastatik kastrasyona duyarlı ve metastatik olmayan, kastrasyona dirençli prostat kanseri için standart bir tedavidir. Biz de metastatik kastrasyon duyarlı prostat kanseri hastamızda enzalutamidin neden olduęu bir interstisyel akcięer hastalıęı vakasını sunuyoruz.

Vaka: Metastatik ve kastrasyona duyarlı prostat kanseri tanısı alan 68 yaşımda erkek hastaya, oral yoldan günlük 160 mg dozunda enzalutamid ile hormonal tedaviye başlandı. 2 ay süreyle bikalutamid ve leuprorelin ile maksimum androjen blokaj tedavisi gördükten sonra Enzalutamide başlandı. Enzalutamid tedavisine başladıktan 35 gün sonra nefes darlıęının başlaması üzerine hasta hastaneye yatırıldı. Deęerlendirilen kontrastlı toraks bilgisayarlı tomografisinde hem üst hem de alt akcięer loblarında yaygın iki taraflı interstisyel infiltrasyonlar ve buzlu cam opasiteleri görüldü. Enzalutamid tedavisine ilişki ilaca baęlı interstisyel akcięer hastalıęının (ILD) olarak deęerlendirildi. Hastada Enzalutamide tedavisi derhal durduruldu. Daha sonra steroid tedavisi başlatıldı. Steroid tedavisi altında semptomları geriledi. 1,5 ay içerisinde steroid altında dramatik yanıt alındı. Hastanın tedavisine dięer anti-androjen tedavisi olan abirateron tedavisi başlandı. takiplerinde ek bir problem tespit edilmedi.

Sonuç: Enzalutamide baęlı İAH nadir olmasına raęmen potansiyel olarak ölümcül bir komplikasyondur. Kullanım endikasyonlarının genişlemesiyle birlikte klinisyenlerin tedavi seęenekleri arasında sıklıkla yer almaktadır. Bu vakanın klinisyenler arasında İAH komplikasyonu konusunda farkındalık yaratacaęına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: dyspnea, interstitial lung disease, enzalutamid