

[Abstract:0417][EP-167]

Metastatik Meme Kanseri Hastalarda İlk ve Daha Sonraki Serilerde Ribociclib +Aromataz İnhibitoru /Faslodeks ile Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi; Tek Merkez Deneyimi

Necdet Üskent, Özlem Topkaya, Volkan Bayraktar, Eda Tanrıkulu Şimşek, Bülent Karagöz, Şeref Kömürcü
Anadolu Sağlık Merkezi, Medikal Onkoloji, Kocaeli

Amaç: Meme kanseri, kadınlar arasında önemli bir sağlık sorunu olup dünya çapında ciddi hastalık ve ölüm oranlarına neden olmaktadır. Hormon reseptör pozitif (HR+)/HER2 negatif (HER2-) meme kanseri, metastatik olguların önemli bir kısmını oluşturmakta olup, CDK4/6 inhibitörlerinin kullanımı, bu hastalığın tedavisinde önemli bir ilerleme kaydedilmesini sağlamıştır. Bu çalışmada CDK4/6 inhibitörü olarak ilk seri veya daha sonraki serilerde Ribociclib ve aromataz inhibitörü alan meme kanseri hastalarının tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: 2021- 2023 tarihleri arasında tedavi almış 67 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların demografik özellikleri, tanı tarihleri, tedavi başlama zamanları ve tedaviye yanıt süreleri gibi bilgiler incelenmiş olup hasta bilgileri elektronik sistem verilerinden toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS v.26 programı kullanılmıştır.

Bulgular: 67 hastanın yaş ortalaması 56,6 (32-84) dir. %97 si(n:65) kadın, % 3 ü (n:2) erkektir. Tanı tarihleri ise 2005 ve 2023 yılları arasında değişkenlik göstermektedir. Olguların % 71'inde kemik, %12'sinde Karaciğer ve %%45'inde akciğer metastazları vardır.%60 Hasta Aromataz inhibitörü %40 ise faslodex ile kombine kullanmıştır. Hastaların %84'ünün performans durumu (ECOG) 0-1 arasındadır.

Hastalarda görülen en yaygın hematolojik yan etki nötropeni %49 (n: 26), trombositopeni %10 (n:5), karaciğer enzim yüksekliği %10 (n:5), Kreatinin yüksekliği %2.1 dir. Hematolojik olmayan advers olaylar ise bulantı %15 (n:8), diyare %8 (n:4), yorgunluk %8 (n:5) dir.hastaların %62 sinde Kısmi yanıt(PR),%16'sında tam yanıt(CR) alınmış olup %22 olgu stabil (SD)seyretmiştir. Objektif yanıt oranı(PR+CR):%'78, Hasalık Kontrol oranCR+PR+S):%100 'dür.

Ayrıca, hastaların MCV, MCHC ve RDW gibi hematolojik parametreleri de takip edilmiştir. Minumum ortalama bazal MCV değeri 85,2(68-105.9), maximum 96.7 (75,8-115); MCHC minumum ortalama 32.3 (29.4-34.7), maximum ortalama ise 34.6 (29.8-36.6), PDW minumum ortalama 9.4 (6.9-15.9), maximum ortalama ise 12.3 (8-21.7) dir. Progresyonsuz sağkalım (PFS) değerleri daha sonra verilecektir.

Sonuç: Ribociclib tedavisi alan hormon reseptör pozitif/HER2 negatif meme kanseri hastalarında tedaviye yanıt oranının ve hastalık kontrol oranının yüksek olduğu görülmüştür. Ancak, hematolojik yan etkilerin ve diğer advers olayların göz önünde bulundurulması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, Ribociclib, Yan etkiler, Onkoloji

Metastatik Meme Kanseri Hastalarda Ribociclib+ Aİ/Faslodeks Tedavisi

Tablo 1. Metastatik Meme Kanseri Hastalarda Ribociclib+ Aİ/Faslodeks Tedavisi (n:72)

1. Sıra	2. Sıra	De Novo Metastatik	İlerleyen Dönemde metastatik
45(%62.5)	27(%37,5)	53(%73,6)	19(%26,3)

Sağkalım, Objektif Yanıt, Hastalık Kontrol Oranları ve Hasta Takip Durum Değerlendirmesi

Tablo 2. Ortalama Takip Süresi ve Progresyonsuz Sağkalım Süresi (n:72)

Ortalama Takip Süresi	Yanıta Kadar Geçen Süre	Progresyonsuz Sağkalım(PFS)
25,5 ay (7-41)	3.3 ay (2.4-8.5)	12.9 ay (4.8-29.7)

Tablo 3. Objektif Yanıt, Hastalık Kontrol Oranları ve Hasta Takip Durum Değerlendirmesi (n:72)

İlk Değerlendirmede Objektif Yanıt ve Hastalık Kontrol Oranları	Hasta Sayısı (n-%)
Tam Yanıt (CR)	12 (%16.6)
Kısmi Yanıt(PR)	43 (%59.7)
Stabil Hastalık(SD)	11 (%15.2)
Progresyon	6 (%8.3)
Objektif Yanıt (CR+PR)	% 76.3
Hastalık Kontrol Oranı	%91.5
Güncel Hasta Takip Durumu	
Tedavisi Devam Eden	42 (%58.2)
Toksosite Nedeniyle Kesilen	7 (%9.7)
*Eksitus	7 (%9.7)
Başka Merkezde Takip	5 (% 6.9)
Takip Dışı Kalan	2 (%12,5)
Progrese olan	9 (% 12,5)
*Exitus nedeni: covid pnömonisi (n:1) ve prognoze hastalık (n:6)	