

[Abstract:0421][EP-170]

**Non-metastatik mide kanserli hastalarda neoadjuvan ve adjuvan tedavi sonuçlarımız:tek merkez deneyimi**

Esmâ Uğuztemur, Banu Öztürk, Derya Kıvrak Salim, Murat Koçer  
SBÜ Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji

**Amaç:** Hastanemiz Tıbbi onkoloji kliniğinde izlenen uzak organ metastazı olmayan mide kanserli hastalarda neoadjuvan/adjuvan tedavi sonuçlarını karşılaştırmak amaçlandı.


**Gereç-Yöntem:** 2014-2024 yılları arasında takip edilen erken evre mide kanserli hasta dosyaları incelendi. hastaların demografik özellikleri, labaratuvar parametreleri, neoadjuv ve adjuvan tedavi modaliteleri, cerrahi, D2 lenf nodu diseksiyon durumu, radyoterapi kaydedildi. kaplan meier yöntemi ile sağkalım analizleri yapıldı.

**Bulgular:** toplam 61 hasta (K/E:16/46) hasta çalışmaya dahil edildi. median yaş 58 (28-79 yıl) idi. Neoadjuvan tedavi alan hasta sayısı 35 idi. hastaların %83'ü FLOT, geri kalanı FOLFOX/XELOX rejimi almıştı. Adjuvan tedavi grubu 28 hastadan oluşuyordu çoğu tedavi rejimi 5-FU ve FOLFOX/XELOX idi. iki tedavi grubu arasında yaş, cinsiyet, ECOG PS,nD2LND oranları benzerdi. ancak RT alma oranı adj grupta daha yüksek ve tm yerleşim açıdan proksimal gastrik kanserler neoadj grupta daha fazla idi. neoadj grupta patolojik TNM evreleri daha erkendi. toplam sağkalım adj grupta 66.4 ay, neoadj grupta 17.4 aydı. (p=0.332)

**Sonuç:** Perioperatik kemoterapi günümüzde standart tedavi yaklaşımı olup kliniğimizde de tercih edilen tedavi modalitesidir. adjuvan tedavi grubunun daha önceki tarihlerde tanı ve tedavi edilmesi nedeniyle ile toplam sağkalım daha uzun görünmekle birlikte neoadjuvan tedavi grubunda patolojik evrede belirgin down-staging göze çarpmaktadır.

**Anahtar Kelimeler:** mide kanseri, neoadjuvan tedavi, evre

resim 1



*Toplam sağkalım*

#### Hasta özellikleri

| Özellik                                       | Adjuvan grup n(%)               | Neoadjuvan grup n(%)            | p değeri |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| cinsiyet<br>kadın<br>erkek                    | 10 (37)<br>17 (63)              | 6 (17)<br>29 (83)               | NS       |
| yaş (ortalama)                                | 56.8                            | 60                              | NS       |
| lokalizasyon<br>proksimal<br>korpus<br>distal | 4(14.8)<br>17(33.3)<br>14(51.8) | 17(48.6)<br>8(22.6)<br>10(28.6) | 0.001    |
| Grad<br>G 1-2<br>G 3                          | 13(45)<br>12(55)                | 11(30)<br>17(70)                | NS       |

|                                    |                             |                               |      |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------|
| pT<br>0<br>1-2<br>3-4              | 4(14.8)<br>2(7.4)<br>21(77) | 7(20)<br>11(21.4)<br>17(48.5) | 0.09 |
| pN<br>0-1<br>2-3                   | 17(63)<br>10(47)            | 20(55)<br>15(45)              | NS   |
| R0rezeksiyon                       | 23(85)                      | 32(91)                        | NS   |
| D2LND                              | 23(85)                      | 21(70)                        | NS   |
| neoadj KT<br>FOLOFOX/XELOX<br>FLOT | -                           | 3(9)<br>29(91)                |      |