

[Abstract:0223][EP-171]

## Bilateral Meme Kanseri Hastalarının Klinikopatolojik Özellikleri, Tek Merkez Deneyimi

Berkan Karabuğa, Ülkü Yalçıntaş Arslan

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara

**Amaç:** Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü olmasına rağmen bilateral meme kanseri son derece nadir görülmektedir. Bu nedenle ikinci bir tümörün varlığının hastalığın prognozuna etkisi net olarak ortaya konamamıştır. Biz çalışmamızda bilateral meme kanseri ile tedavi ve takip edilen hastaların klinikopatolojik özelliklerini inceleyerek hastalığın tedavi ve takibindeki tecrübelerimizi paylaşmayı amaçladık.


**Gereç-Yöntem:** 01.01.2015-31.01.2024 tarihleri arasında Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilateral meme kanseri tanısı ile tedavi ve takip edilen 30 hasta çalışmamıza dahil edilmiştir. Çalışmamızın primer sonlanım noktaları progresyonsuz sağkalım ve genel sağkalım olarak belirlenmiştir.

**Bulgular:** Çalışmamıza dahil edilen toplam 30 hastanın demografik özellikleri tablo 1.'de verilmiştir. Hastaların median genel sağkalım süresi 112.1 ay (CI %95, 84.9-139.4) iken median progresyonsuz sağkalım süresi 43.9 ay (CI %95, 29.2-58.7) olarak saptandı. Tanı anında nod negatif olanların median genel sağkalım süresi 115.6 ay (CI %95, 67,1-164.1) iken nod pozitif olanların median genel sağkalım süresi 112.1 aydı. (CI %95, 81.9-142.4) (p:0.48) (Grafik 1.) Tanı anında nod pozitif olanların median progresyonsuz sağkalım süresi 48.3 ay (CI %95, 12.5-84.0) nod negatif olanların median progresyonsuz sağkalım süresi 43.9 ay (CI %95, 34,3-53.6) (p:0.56) olarak bulundu.(Grafik 2.)

**Sonuç:** Merkezimizde bilateral meme kanseri ile takipli hastaların klinikopatolojik özellikleri incelenmiş, tanı anında nod pozitif ve nod negatif hastalar arasında genel sağkalım ve progresyonsuz sağkalım süreleri açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır.


**Anahtar Kelimeler:** bilateral, meme kanseri, sağkalım

### Grafik 1.



*Tanı anında nodal tutulum varlığına göre genel sağkalım*

**Grafik 2.**



*Tanı anında nodal tutulum varlığına göre progresyonsuz sağkalım*

**Tablo 1.**

|                                    |                  |    |       |
|------------------------------------|------------------|----|-------|
| <b>Menapozdurum</b>                | Postmenapozal    | 19 | %63.3 |
|                                    | Premenapozal     | 11 | %36.7 |
| <b>Mutasyon</b>                    | Mutasyon Yok     | 11 | %36.7 |
|                                    | BRCA 1           | 1  | %3.3  |
|                                    | BRCA 2           | 0  | %0    |
|                                    | BRCA 1-2         | 0  | %0    |
|                                    | Bilinmiyor       | 18 | %60   |
|                                    |                  |    |       |
| <b>Senkronizasyon</b>              | Senkron          | 4  | %13.3 |
|                                    | Metakron         | 26 | %86.7 |
| <b>Tümör Lokalizasyonu</b>         | Sağ              | 19 | %63.3 |
|                                    | Sol              | 7  | %23.3 |
|                                    | Bilateral        | 4  | %13.3 |
| <b>DCIS</b>                        | Yok              | 13 | %43.3 |
|                                    | Var              | 17 | %56.7 |
| <b>Nodal Tutulum</b>               | Pozitif          | 19 | %63.3 |
|                                    | Negatif          | 11 | %36.7 |
| <b>Nodal Evre</b>                  | N0               | 11 | %36.7 |
|                                    | N1               | 15 | %50   |
|                                    | N2               | 1  | %3.3  |
|                                    | N3               | 3  | %10.0 |
| <b>Histoloji</b>                   | İnvaziv Duktal   | 23 | %76.7 |
|                                    | İnvaziv Lobüler  | 3  | %10   |
|                                    | Diğer            | 1  | %3.3  |
| <b>Operasyon</b>                   | MRM              | 20 | %66.7 |
|                                    | MKC              | 6  | %20.0 |
|                                    | Basit Mastektomi | 4  | %13.3 |
| <b>İlk Tanıda Primer Tümör IHC</b> | HR(+) HER2(-)    | 17 | %56.7 |
|                                    | HR(+) HER2(+)    | 2  | %6.7  |
|                                    | HR(-) HER2(+)    | 6  | %20.0 |
|                                    | TNBC             | 5  | %16.7 |
| <b>2. Primer tümör IHC</b>         | HR(+) HER2(-)    | 17 | %17.0 |
|                                    | HR(+) HER2(+)    | 6  | %20.0 |
|                                    | TNBC             | 7  | %23.3 |

*Demografik ve patolojik özellikler*