

[Abstract:0397][EP-175]

Paraneoplastik artrit tanısı alan solid tümör vakalarının klinik ve laboratuvar bulguları

Osman Cüre¹, Bayram Kızılkaya², Neşe Alyıldız³

¹recep tayyip erdoğan üniversitesi tıp fakültesi, iç hastalıkları anabilim dalı, romatoloji, rize

²recep tayyip erdoğan üniversitesi tıp fakültesi, iç hastalıkları anabilim dalı, rize

³recep tayyip erdoğan üniversitesi tıp fakültesi, iç hastalıkları anabilim dalı,onkoloji, rize

Amaç: Paraneoplastik artrit (PA), malignitenin habercisi olabilecek paraneoplastik sendromlardan biridir. PA'da romatolojik hastalıklara benzer hem laboratuvar hem de klinik bulgular görülebilir.. Bu bağlamda 6 yıllık sürede paraneoplastik artritli 16 hastanın klinik ve laboratuvar bulgularını ve malignite tipini bu çalışmada sunduk. Paraneoplastik artrit ile ilişkili en sık solid organ tümörü meme kanseriydi. Hastalarda sık eklem tutulum şekli simetrik ve üst ekstremitelerde eklem tutulumu olarak görüldü. Özellikle tedaviye yanıt vermeyen, akut başlayan, kilo kaybı ve ileri yaş artrit vakalarında paraneoplastik artrit dışlamak gerekir.

Gereç-Yöntem: Haziran 2018-Ocak 2024 tarihleri arasında artrit ile romatoloji polikliniğimize başvurup paraneoplastik artrit tanısı alan 16 vakanın, yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, eklem tutulum şekli, şiş ve hasas eklem sayıları, laboratuvar bulguları ve malignite tipleri retrospektif olarak incelendi

Bulgular: Haziran 2018-Ocak 2024 tarihleri arasında artrit ile romatoloji polikliniğimize başvurup paraneoplastik artrit tanısı alan 16 vakanın, yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, eklem tutulum şekli, şiş ve hasas eklem sayıları, laboratuvar bulguları ve malignite tipleri retrospektif olarak incelendi
Sonuç: Paraneoplastik artrit az görülmesine rağmen romatolojik hastalıkları ile karışabilir. Özellikle tedaviye yanıt vermeyen, akut başlayan, otoantikör negatif, kilo kaybı ve ileri yaşta artrit gelişen vakalarda paraneoplastik artrit dışlamak gerekir.

Anahtar Kelimeler: Solid tümörler, paraneoplastik artrit

Hastaların klinik ve laboratuvar sonuçlarına ait tanımlayıcı istatistikleri

Değişken	n=16
Yaş	65.94 ± 10.9
Kadın	11 (68.8)
VKİ	80 ± 8.6
Sigara	2 (12.5)
Komorbidite	
Hipertansiyon	9 (56.3)
Diabetes Mellitus	2 (12.5)
Malignite	
Meme Ca	9 (56.3)
Prostat Ca	3 (18.8)
Mide Ca	2 (12.5)
Akciğer Ca	2 (12.5)
Eklem tutulum şekli ve yeri	
Simetrik	12 (75)
Asimetrik	4 (25)
Üst Ekstremité	13 (81.3)
Alt Ekstremité	8 (50)
Artrit eklem sayısı	5.44 ± 4.13
Laboratuvar	
Anti nükleer antikor	
Negatif	16 (100)
Romatoid Faktör	
Pozitif	6 (37.5)
Anti- CCP	
Pozitif	4 (25)
ESR	51.5 ± 17.08
CRP	45.46 ± 40.11