

Abstract:272

SB-62

**MUKOZAL MALİGN MELANOM TANILI HASTALARIN
KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE METASTATİK EVRE
TEDAVİ SONUÇLARI**

Burak Paçacı¹, Mustafa Alperen Tunç¹, İbrahim Vedat Bayoğlu¹

¹Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tıbbi
Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul

Amaç

Mukozal malign melanomlar, nadir görülen ancak agresif seyirli tümörler olup klinik ve patolojik özellikleri ile metastatik evredeki tedavi yanıtları açısından heterojen bir grup oluşturmaktadır. Bu çalışmada, mukozal melanom tanılı hastaların klinikopatolojik özelliklerini değerlendirmek ve metastatik evrede uygulanan tedavilerin etkinliğini analiz etmek amaçlanmıştır.

Yöntem

Çalışmamızda, 2010-2024 yılları arasında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran histopatolojik inceleme ile mukozal melanom tanısı almış 26 hastanın demografik verileri, tümör lokalizasyonları, evreleri, lenf nodu tutulumu, tümör boyutları ve B-RAF proto-onkogen (BRAF) mutasyon durumu incelenmiştir. Metastatik evrede tedavi edilen hastalarda kullanılan sistemik tedavilere objektif yanıt oranları (ORR) ve hastalık kontrol oranları (DCR) değerlendirilmiştir.

Bulgular

Hastaların medyan yaşı 68,5 olup, yaş aralığı 34-91 arasındaydı. En sık görülen tümör lokalizasyonları oral kavite (n=6, %23), nazal kavite (n=6, %23) ve anal kanal (n=6, %23) olarak saptandı. Lenf nodu tutulumu %46,2 oranında gözlendi. Hastaların tanı anında 11'i (%42,3) lokal, 11'i (%42,3) lokal ileri ve 4'ü (%15,4) metastatikti. Metastatik evrede en sık metastaz bölgeleri akciğer (n=6, %23), karaciğer (n=5, %19,2) ve kemikti (n=5, %19,2). Sistemik tedavi yanıtlarında, ilk basamak tedavi olarak en sık temozolomid kullanıldı. Temozolomid alan 10 hastada %10 objektif yanıt %20 hastalık kontrol oranı saptandı. 2.basamakta en sık Nivolumab kullanıldı. Nivolumab uygulanan 6 hastada %50 ORR ve %50 DCR elde edildi.

Sonuç

Mukozal melanomlar klinik ve patolojik açıdan heterojen bir grup olup, metastatik evredeki tedavi yanıtları oldukça değişkenlik göstermektedir. Çalışmamız, immünoterapiler ve kemoterapilerin etkinliğini ortaya koyarken, mukozal melanom hastalarında daha etkili tedavi stratejilerine ihtiyaç

duyulduğunu vurgulamaktadır. Daha geniş ölçekli çalışmalarla bu nadir tümör grubunda optimal tedavi yaklaşımlarının belirlenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: mukozal malign melanom, braf, klinikopatolojik özellikler

Resim Açıklaması: Klinik ve Patolojik Özellikler

Klinik ve Patolojik Özellikler	
Yaş n (Medyan, aralık)	68,5 (34-91)
ECOG n(%)	
0-1	24 (92,3)
≥2	2 (7,7)
Cinsiyet n(%)	
Kadın	14 (53,8)
Erkek	12 (46,2)
Tümör lokalizasyonu n(%)	
Oral kavite	6 (23)
Nazal	6 (23)
Anal kanal	6 (23)
Rektum	2 (7,6)
Vulva	2 (7,6)
Vajina	1 (3,8)
Nazofarenks	1 (3,8)
Uvula	1 (3,8)
Özefagus	1 (3,8)
Evre n(%)	
Lokal	11 (42,3)
Lokal İleri	11 (42,3)
Metastatik	4 (15,4)
Lenf nodu tutulumu n(%)	
Yok	14 (53,8)
Var	12 (46,2)
Tümör boyutu mm (Medyan, aralık)	30 (7-73)
BRAF durumu n(%)	
Pozitif	1 (3,8)
Negatif	7 (27)
Bilinmiyor	18 (69,2)
Metastatik evredeki metastaz bölgeleri n(%)	
Akciğer	6 (23)
Karaciğer	5 (19,2)
Kemik	5 (19,2)
Beyin	4 (15,3)
Uzak LAP	3 (11,5)
Sürrenal	2 (7,6)
Kemik iliği	1 (3,8)
Tiroid	1 (3,8)
Plevra	1 (3,8)

Resim Açıklaması: Metastatik 1.seri tedavi yanıtları

Metastatik 1.seri tedavi yanıtları							
	Hasta Sayısı	CR	PR	SD	PD	ORR (%)	DCR (%)
Temozolomid	10	0	1	1	8	10	20
Nivolumab	2	0	0	0	2	0	0
Karboplatin+Paklitaksel	3	0	1	0	2	33	33
İpilimumab	1	0	0	0	1	0	0

Resim Açıklaması: Metastatik 2.seri tedavi yanıtları

Metastatik 2.seri tedavi yanıtları							
	Hasta Sayısı	CR	PR	SD	PD	ORR (%)	DCR (%)
Nivolumab	6	2	1	0	3	50	50
Karboplatin+Paklitaksel	2	0	1	0	1	50	50
İpilimumab	3	0	0	0	3	0	0
Dabrafenib+Trametinib	1	0	0	0	1	0	0